

Febre tifóide com manifestações extraintestinais: relato de caso Typhoid fever with extraintestinal manifestations: case report

Madalena Nimi¹, Iracelma Gonçalves¹, Acácio Jololo¹, Odeth Tjikongo¹, Agostinho Napato¹, Edna Viegas¹, Ermelindo Filipe¹

¹Clínica Sagrada Esperança-Angola

Introdução

Febre entérica é uma doença sistêmica grave causada classicamente pela *Salmonella* entérica sorotipo Typhi. Os Sintomas incluem dor abdominal, febre e calafrios, podendo variar em gravidade, que surgem 5-21 dias após consumo de alimentos/água contaminados¹.

Objectivo

Apresentar um caso de febre entérica grave com manifestações extraintestinais.




Figura A. TAC abdominal com hepatoesplenomegália e distensão de ansas

Figura B. Radiografia simples do abdômen em pé

Referências bibliográficas

1. Enteric (typhoid and paratyphoid) fever: Epidemiology, clinical manifestations, and diagnosis. UpToDate, 2022
2. Enteric (typhoid and paratyphoid) fever: Treatment and prevention. UpToDate, 2022

Caso clínico

Homem de 26 anos, transferido de uma instituição (onde foi tratado por malária grave) por agravamento da icterícia, dor e distensão abdominal, obstipação e edema periférico. A ecografia abdominal revelou hepatomegália e vesícula biliar com conteúdo heterogêneo com nível líquido. Cumpriu antibioticoterapia com metronidazol e ceftriaxona sem melhoria. Na admissão na UCI foi valorizada sépsis com foco abdominal.

Evolução no internamento:

- Dificuldade respiratória e depressão do nível de consciência com necessidade de sedoanalgesia e VM.
 - LRA com necessidade de TSR.
 - Paragem de gases e fezes, e Hematoquêsia. EDA normal, Colonoscopia (múltiplas úlceras).
 - Febril, Hemoculturas com *Salmonella* typhi sensível a ciprofloxacina.
- Alta melhorada.

Discussão/conclusão

A febre entérica faz diagnóstico diferencial em quadro febril associado a sintomas gastrointestinais. Este doente apresentou além dos sintomas comuns comprometimento respiratório, renal e neurológico.

- **Manifestações extraintestinais focais** (incluindo envolvimento do sistema hepatobiliar, cardiovascular, respiratório, geniturinário e nervoso central) são observados com pouca frequência¹.
- Na doença grave o tratamento é por via parenteral e apesar dos relatos de resistência antimicrobiana em particular a fluoroquinolonas^{1,2}, o doente apresentou um caso grave sensível à Ciprofloxacina




Figura C. Colonoscopia com observação de múltiplas úlceras de grandes dimensões, bordos congestivos e elevados

Como Citar: Nimi, M., Jololo, A., Tjikongo, O., Napato, A., Viegas, E., & Filipe, E. (2024). Febre tifóide com manifestações extraintestinais: relato de caso. Revista Científica Da Clínica Sagrada Esperança, (Número 12 Ano.16 Agosto 2024), 93. <https://doi.org/10.70360/rccse.v.152>



Não comercial — Você não pode usar o material para fins comerciais